DESCRIPTION DES CLYTIDES DU BRÉSIL[1].

Par M. Aug. CHEVROLAT.

(Séance du 25 Septembre 1861.)

Depuis 1814, époque où le commerce extérieur prit un grand développement, le Brésil est sans contredit le pays d'où l'on ait reçu le plus de Coléoptères d'outre-mer; aussi beaucoup d'espèces de Clytides de ce vaste empire sont-elles généralement répandues et la plupart connues.

Dans les deux ouvrages qui traitent le plus particulièrement de ces insectes (2), vingt-une espèces sont décrites et une seule est citée sans description.

Deux sont à déduire: 1° le *Neoclytus* (*Clytus*) *curvatus* Germar, dont le *N. (Cl.) dorsalis* Dej., Lap. et Gory ne forme qu'une variété; 2° le *Mecometopus* (*Clytus*) *festivus* Fab., qui est désigné dans la monographie comme étant du Brésil. Sa véritable patrie est la Guyane française. Nous en parlerons dans quelque temps.

Quant aux (*Cyllene*) *Clytus proximus*, *rufipes*, *congener* et *castaneus*, décrits par les monographes, ils auraient besoin d'être vus en nature, et décrits à nouveau, le signalement ne concordant pas toujours avec les figures qui en ont été données et le dessous du corps n'ayant pas été étudié et décrit de manière à les faire reconnaître.

Le (*Cyllene*) *Clytus acutus* Germar, dont les auteurs cités plus haut ont reproduit une nouvelle description, et qui appartient à ce groupe difficile, en fournit la preuve évidente. Germar lui donne quatre bandes au prothorax et MM. Laporte et Gory n'en mentionnent que trois. *Il en a véritablement cinq*, la quatrième bande, en effet, est raccourcie, suit obliquement la tranche supérieure de l'angle postérieur, et se dirige vers le milieu de la base.

Outre les vingt-deux espèces déjà connues, j'en décris aujourd'hui dix-sept qui étaient inédites. Cela portera à trente-neuf le chiffre de celles indiquées ci-après.

(1) Voyez 1er Mémoire : *Clytides du Mexique*, ann. 1860, pages 451 à 504, pl. 9, fig. 1 à 12; — 2e Mémoire : *Clytides de l'ancienne Colombie*, ann. 1861, pages 377 à 388.

(2) Laporte et Gory, Monographie du genre *Clytus*, 1841. — Adam White, Catal. of British Museum, 1855, pages 249 à 291.

A l'exception des espèces ayant les nos 2, 3, 8, 9, 22, 25 et 34 à 39, que je ne possède pas, toutes les autres font partie de ma collection.

Lorsque j'aurai étudié et décrit tous les Clytides Américains (moins ceux des États-Unis), par contrées géographiques, je me propose d'en donner une liste générale, réunissant alors les espèces qui ont le plus d'analogie entre elles et les groupant, soit d'après le nombre des bandes du corselet, soit de la longueur ou de la brièveté des pattes, etc. ; ce sera, je crois, le moyen de lever tous les doutes sur leur identité.

Il m'a paru nécessaire d'établir deux nouveaux genres, celui d'*Apelocera* et de *Megalobas*.

1. CYLLENE PROXIMA. — *Nigra, thoracis globosi fasciis tribus, elytrorum fascia baseos et maculis undecim luteis.* — Long. 19 mill., lat. 6 1/6 mill. — Patrie : Le Brésil.

Clytus proximus Lap. et Gory, Hist. nat. et Iconog., Mon. des *Clytus*, 1841, p. 5, pl. 2, fig. 2. — A. White, Cat. British Mus., p. 249, n° 2. = *Clytus rufipes* Dej., Cat., 3e édit., p. 356.

2. CYLLENE RUFIPES. — *Nigra, thoracis fasciis tribus, elytrorum lineis quinque et punctis suturalibus tribus luteis ; pedibus antennisque rubris.* — Long. 15 3/4 mill., lat. 5 mill.. — Patrie : Le Brésil.

Clytus rufipes Lap. et Gory, loc. cit., p. 8, pl. 2, fig. 6.

3. CYLLENE CONGENER. — *Nigra, thorace rotundato fasciis tribus luteis ; elytris fasciâ baseos rectâ, fasciis quatuor arcuatis punctisque suturalibus quatuor luteis ; pedibus antennisque ferè rubris.* — Long. 17 1/2 mill., lat. 5 mill. — Patrie : Le Brésil.

Clytus congener Lap. et Gory, loc. cit., p. 8, pl. 3, fig. 7.

4. CYLLENE DESIGNATA. — *Nigra velutina ; capite, prothorace infra pectoreque cinereis ; in capite maculis duabus anticis fasciaque postica, in prothorace fasciis quinque* (1a *et* 4a *cinereis*), *in elytris fasciis quinque undatis* (1a *atque macula conica, communi, conjuncta fasciæ tertiæ, luteis*) *fasciis quatuor posticis albidis ; septem maculis in lateribus corporis : sulphureis ; macula coxæ posticæ albida et transversa.* — Long. 13 1/2 mill., lat. 2 1/2 mill.

Voisine des *C. cayennensis* et *congener* Lap. et Gory, d'un noir velouté. *Palpes* et *lèvre* d'un roux ferrugineux. *Tête* ayant un sillon élevé et aplati en avant, marquée de deux taches en avant et d'une bande postérieure

jaunes. *Mandibules* noires. *Yeux* châtains. *Antennes* et *pattes* noires, recouvertes d'une indumentation cendrée. *Prothorax* offrant cinq bandes, première, et quatrième située sur le bord de l'angle postérieur, cendrées, les trois autres sont d'un beau jaune. *Écusson* semi-arrondi, noir, jaune au sommet. *Élytres* ornées de cinq bandes ondées, première jaunâtre, voûtée en dessus au milieu, et appuyée à l'écusson, les quatre suivantes blanches, la troisième se convertit sur la suture en une tache conique d'un beau jaune de soufre, la quatrième est interrompue et un point blanc, de chaque côté, le long de la suture, doit quelquefois se réunir avec celle-ci. Le dessous du corps offre de chaque côté sept taches jaunes ; dont six latérales ; première allongée sur la base du prothorax, deuxième, troisième et quatrième le long de la poitrine, la cinquième est un peu en dedans, sixième à huitième en forme de bandes, sur les trois premiers segments de l'abdomen. La tache qui est en regard de la hanche postérieure est transverse et d'un blanc de lait. *Pygidium* entièrement jaune.

Un seul exemplaire, des environs de Rio-Janeiro, m'a été envoyé, dans le temps, par M. Ad. Pompon.

Cette espèce se distingue du *C. cayennensis* par une bande en plus (la cinquième) aux élytres, elle n'offre pas le trait blanc sutural qui termine l'étui et le dessous du corps qui n'a que six taches, dont deux blanches et quatre jaunes, en offre, dans l'espèce nouvelle, neuf, dont une seulement est blanche.

5. Cylleme acuta. — *Nigra, thorace lineis transversis quatuor (quinque) flavis, elytris apice mucronatis nigris, fasciis quinque flavis, 2ª et 3ª antrorsum, ultimis retrorsum arcuatis.* — Long. 18 1/2 mill., lat. — Patrie : Le Brésil, Rio-Janeiro.

Clytus acutus Germ., Mag., IV, 1821, p. 170, n° 80. — Lap. et Gory, Mon., p. 9, pl. 3, fig. 8. — A. White, Cat. Br. Mus., p. 250, n. 7. = *Clytus brasiliensis* Dej., Cat., 3ᵉ éd., p. 356.

6. Cyllene falsa. — *Nigra, velutina ; capite fasciolis tribus luteis ; thorace fasciis quinque, 1ª et 4ª cinereis, cæteris lætè flavis ; elytris fasciis quinque albidis ; 2ª et 3ª antice angulatis, duabus ultimis medio undulatis, 1ª late arcuata, fere tota et 3ª ad suturam luteis ; prothorace infra et pectore cinereis ; lateribus corporis maculis octo ; tribus flavis, quatuor niveis, nempe : tertia, quinta, septima et octava : 1ª infra marginem posticum prothoracis, griseo-flavoque mixta.* — Long. 16 mill., lat. 5 mill. — Du Brésil. Une seule ♀.

Cette espèce est voisine du *C. cayennensis* Lap. et Gory. Elle s'en distingue par les caractères suivants : première et quatrième bandes du prothorax plus largement cendrées. Élytres avec cinq bandes au lieu de quatre, première affectant la même courbe que chez l'espèce comparative, jaune blanchâtre sur chacune des extrémités, les quatre suivantes blanches, deuxième et troisième également anguleuses vers le haut de la suture, dernière émettant sur la suture un trait jaune qui est un peu anguleux et allongé, quatrième et cinquième très flexueuses au centre de l'étui. Côtés du corps en dessous avec huit taches ; première arquée, grise, mélangée de jaune, située au bord inférieur du prothorax, deuxième, quatrième et sixième d'un beau jaune, troisième, cinquième, septième et huitième blanches, la cinquième est appuyée presque sur la hanche postérieure. *Pygidium* offrant un trait jaune allongé, subconique, ayant son extrémité inférieure arrondie. *Antennes* noires. *Pattes* de même couleur, recouvertes de cendré.

7. CYLLENE CONSIMILIS.—*Valde affinis* CL. ACUTO Germari. *Nigra, velutina in capite fasciis tribus, in prothorace fasciis quinque (1ª et 4ª cinereis); scutello ad apicem; elytrisque fasciis quinque (2ª semper albida, cæteris extus jam albidis vel flavis) flavis, punctis duobus suturalibus; prima pari flava, 2ª alba; corpore infra, sexdecim maculis luteis, macula coxæ posticæ lactea.* — Long. 11-13 1/2 mill., lat. 2 1/2-3 3/4 mill. — ♂ et ♀ de la province de Saint-Paul, au Brésil.

Cet insecte n'est peut-être qu'une variété locale du *Cl. acutus* Germ. Mêmes dessins en dessus, il en diffère par la deuxième bande des élytres qui est constamment grise, par la deuxième tache suturale qui est blanche, le ♂ se signale en outre par les quatre autres bandes qui sont blanches, elles sont jaunes dans la ♀, de plus l'*abdomen* ne présente que trois taches, et on en remarque quatre chez la *C. acuta.*

8. CYLLENE CASTANEA. — *Castanea; thoracis lineolis transversis tribus, elytrorum lineolis quinque et linea suturali, luteis.* — Long. 13 1/2 mill., lat. 5 mill. — Patrie : Le Brésil.

Clytus castaneus Lap. et Gory, loc. cit., p. 10, pl. 3, fig. 10 et 12. — A. White, Cat. Br. Mus., p. 251.

9. CYLLENE ANACANTHA. — *Nigra, velutina; ore, antennis in dimidia parte basali (ad apicem fuscis) pedibusque rubris; in capite fasciis tribus, fasciis quinque in thorace, scutello ad apicem, in elytris fasciis quinque punctisque duobus, sulphureis; pectore et abdomine sexdecim ma-*

culis læte flavis; macula coxa posticæ alba. — Long. 12-15 mill., lat. 3-4 mill. — De Rio-Janeiro (Brésil).

Apex elytri subangulato necnon spinoso.

D'un beau noir velouté. *Bouche, antennes,* avec les quatre premiers articles (suivants rembrunis) et *pattes* d'un rouge pâle. *Tête* marquée de trois bandes jaunes; première sur le bord antérieur, deuxième occupant tout le centre des antennes, troisième en arrière, réunie le long des yeux à la première. *Prothorax* globuleux, orné de cinq bandes jaunes, quatre sont droites, mais la quatrième est raccourcie, oblique et part du dessus de l'angle postérieur. *Écusson* noir, à sommet jaune, offrant sur chaque côté à sa base, lorsqu'il est abaissé, une tache punctiforme jaune. *Élytres* parallèles, unicostées sur chaque étui et seulement anguleuses au sommet, signalées par cinq bandes et deux points sur chacune, d'un beau jaune; première en chevron ayant sa courbure anguleuse, appuyée sur le sommet de l'écusson, deuxième et troisième arquées en dessous sur le milieu de l'étui, un point en marge de la deuxième, quatrième courte, directe, offrant en regard un point sutural, cinquième oblique, flexueuse au centre, toutes sont à égale distance. En plus, sous l'épaule, une grande tache jaune. Prothorax en dessous entièrement jaune. *Poitrine* offrant sur chaque côté cinq taches jaunes, dont trois latérales. *Abdomen* marqué de cinq bandes ou taches coniques qui s'appuient au bord inférieur des segments et diminuent de grandeur. La tache qui est en regard des hanches postérieures est blanche et transverse.

Je possède un ♂ et une ♀ de cette espèce qui a été trouvée par M. Adolphe Pompon, près de Rio-Janeiro.

Voisine du *C. consimilis;* nous la placerons, en raison de la terminaison des élytres, vers la fin de sa division.

10. Cyllene insignita. — *Nigra, velutina; capite longitrorsùm striato, flavo tri-vittato; prothorace transverso, ad basin valdè constricto, supra paululùm gibbo, fasciis tribus flavis notato: elytris prope suturam longitrorsùm carinatis, apice spinâ mediana armatis; singulo elytro tribus maculis et quatuor fasciis flavis ornato; antennis pedibusque brunneonigris; tibiis apice tarsisque rufis.* — Long. 20 mill., lat. 7 mill. — Brésil.

Clytus insignitus Perroud, Mélanges Entomol., 3e partie, Lyon, 1855, p. 68.

11. Cyllene patruelis. — *Valida, nigra; capite sulcato, fasciis tribus, tribus in thorace (media paululum retro arcuata), elytrorum fasciis quinque (1a recta 2a et 3a arcuatis 4a et 5a brevibus margine adnexis),*

maculaque commune supra fasciam quartam : pallide flavis; in lateribus pectoris maculis quatuor et abdominis fasciolis quinque flavo-pallidis; ore, antennis pedibusque crassis, ferrugineis. — Long. 14-18 mill., lat. 4-4 1/2 mill. — Patrie : Le Brésil.

Clytus patruelis Dej., Cat., 3e édition, page 356. = *Clytus idoneus* (Dej.).

Robuste, noirâtre, marquée de bandes et taches d'un jaune pâle verdâtre. *Tête* sillonnée longitudinalement sur le front, ornée de trois bandes. *Bouche, antennes* (épaisses) et *pattes* ferrugineuses. *Prothorax* arrondi, offrant trois larges bandes, deuxième un peu arquée en dessous. *Écusson* aux trois quarts jaunâtre. *Élytres* un peu amincies vers l'extrémité, unicarénées et épineuses au sommet, signalées par cinq bandes; première droite, liée à l'écusson, deuxième et troisième arquées en dessous, quatrième et cinquième obliques, quatrième partant de la marge limitée à la carène, offrant de chaque côté, en dessus, une grosse tache, ou ronde ou anguleuse, qui touche à la suture, la cinquième est entière et se fléchit en dessous sur la suture. *Pygidium* jaune, n'ayant qu'une légère bordure noire. Dessous du prothorax jaune, avec deux taches brunes sur le côté, formées du prolongement des deux dernières bandes du dessus. *Corps* en dessous brun, poitrine présentant quatre taches, l'une arrondie et l'autre allongée sur chaque côté. *Abdomen* avec cinq bandelettes ou taches transverses et anguleuses.

Dejean avait fait de la ♀ son *Clytus patruelis* et du ♂ le *C. idoneus*; ce dernier est plus grand, plus allongé et assez aminci postérieurement. Le premier a été rapporté du Brésil par M. Th. Lacordaire, et le deuxième lui a été envoyé par M. M. C. Sommer.

12. CYLLENE CHALYBEATA. — *Nigerrima, capite antice et postice flavo, thorace maculis duabus posticis flavis, elytris nigro-chalybeis velutinis, singulis lineolis duabus per obliquis una trans angulam humeralem, altera post scutellum ad medium latius currente; abdominis basi singulis lateribus plagis duabus magnis albidis.* — Long. 21 mill., lat. 2-4 mill. — Patrie : Brésil (Spirito-Sancto).

Clytus chalybeatus A. White, Cat. British Mus., 2, 1855-56, p. 250. = *Clytus oculatus* Dej., Cat., 3e édit., p. 356.

Avec cette espèce commence la troisième division *à corps plus large, plus court, à antennes épaisses.*

13. CYLLENE MELLYI. — *Cinerea infra, supra nigra et velutina; anten-*

nis sat validis, nigro-cinereis, articulis 2-6 *ad apicem intus breviter spinuloso-pilosis; prothorace remote punctato, vix piloso, postice cinereo; elytris singulatim bifasciatis et quadrimaculatis; duabus suturalibus* (1ª *sæpe deficiente*) *cinereis et aurantiacis* (*unicostatis et ad apicem breviter spinosis*) *; abdomine nigro fasciis duabus latis sericeo-albidis.* — Long. 10-15 mill., lat. 2 3/4 - 4 mill. — Bahia, Rio-Grande (Brésil).

Clytus Reichei (Gory). = *Clytus Mellyi* (Chev.), Cat. British Mus., p. 272, n° 100.

Courte et épaisse, d'un noir velouté en dessus, cendrée en dessous. *Tête* cendrée, offrant un sillon longitudinal, marquée quelquefois sur le front d'une tache rousse, côte intra-antennaire, noire et lisse. *Palpes, mandibules*, sur la tranche interne, et *yeux* noirs. *Antennes* noires, revêtues d'une poussière grise, courtes, épaisses, articles deuxième à sixième terminés sur un seul côté par un pinceau de poils épineux. *Prothorax* large, arrondi, un peu déprimé en dessus, noir, étroitement marginé de cendré en avant et plus largement en arrière, le disque offre parfois une ponctuation irrégulière, avec quelques longs poils blonds. *Écusson* grand, semi-arrondi, cendré. *Élytres* ornées chacune de deux bandes et de quatre taches, dont deux suturales (la première fait quelque fois défaut), la première bande basale et la première tache suturale sont cendrées, tandis que les autres sont d'un jaune-orangé, la deuxième bande est située vers les deux tiers de la longueur. *Pattes* et dessous du *corps* cendrés. *Abdomen* noir, présentant sur le premier et le deuxième segment, une grande tache anguleuse d'un blanchâtre soyeux et qui s'appuie au bord postérieur. *Cuisses* courtes, aplaties, épaisses, genoux intermédiaires unis et postérieurs brièvement bidentés.

Je possède trois exemplaires de cette espèce. Elle devra se placer à la suite du *Cl. chalybeatus* White.

14. Cyllene Hoffmanni. — *Villosa, nigra; thorace globoso; elytris cupreo-acutis, longitudinaliter unicostatis fasciis duabus obliquis et altera transversa cinereis, corpore subtus maculis quatuor flavis.* — Long. 15 1/2 mill., lat. 5 mill. — Patrie : Amér. du Sud.

Clytus Hoffmanni Lap. et Gory, loc. cit., p. 13, pl. 3, fig. 13 *bis.* — Ad. White, Cat. Br. Mus., p. 253, n° 18.

15. Neoclytus impar. — *Thorace oblongo, ater, elytris cruce basali fasciaque intra medium flavis, apice truncatis, spinosis, pedibus intermediis longissimis.* — Long. 14-20 mill., lat. 3-5 mill. — Patrie : Le Brésil, Rio-Janeiro.

Clytus impar Germ., Sp., 1824, p. 517, n° 692. — Lap. et Gory, loc. cit., p. 21, pl. 5, fig. 24. — Ad. White, Cat. Br. Mus., p. 256, n. 31. = *Clytus cylindricus* Dej., Cat., 3e éd., p. 356.

16. NEOCLYTUS PUSILLUS. — *Niger; elytrorum lineâ baseos semicirculari et fasciis duabus suturalibus luteis.* — Long. 11 mill., lat. 3 2/3 mill. — Patrie : Le Brésil, Buénos-Ayres et la Bolivie.

Clytus pusillus Lap. et Gory, loc. cit., p. 22, pl. 5, fig. 25. — Ad. White, Cat. Br. Mus., p. 256, n. 32. = *Clytus philanthus* Dej., Cat., 3e éd., p. 356.

17. NEOCLYTUS CURVATUS. — *Niger, thorace punctis quatuor flavis, elytris fasciis duabus arcuatis maculaque ante apicem suturali flavis.* — Long. 10 à 17 mill., lat. 3 à 5 mill. — Patrie : Le Brésil.

Clytus curvatus Germ., Mag., t. 4, p. 171. — Lap. et Gory, loc. cit., p. 25, pl. 6, fig. 29. = *Clytus dorsalis* Dej., Cat., 3e éd., p. 356, var. = Lap. et Gory, loc. cit. p. 23, pl. 5, fig. 27. — Ad. White, Cat. Br. Mus., p. 256, n. 33.

Niger ; thorace longitudinaliter subelevato, fasciis tribus; elytris maculis duabus baseos, lineis tribus transversis obliquis et maculâ apicali luteis.

M. Sommer m'a envoyé une ♀ provenant de Lagoa-Sancta (province de Saint-Paul), qui est brune, a les pattes et les antennes ferrugineuses, et dont les dessins et taches sont blancs, au lieu d'être jaunes.

18. NEOCLYTUS MAGICUS. — *Niger, elytris antice ferrugineis; sutura striisque duabus obliquis albis; postice nigris, fascia alba; pedibus posterioribus elongatis.* — Long. 13-17 mill., lat. 3 1/2 - 4 1/2 mill. — Patrie : Le Brésil.

Clytus magicus Perty, Delect., An. Art., pag. 93, tab. 18, fig. 16.—Lap. et Gory, loc. cit., p. 25, pl. 6, fig. 30. — Ad. White, Cat. Br. Mus., p. 256, n. 34. = *Clytus basalis* Dej., in Museo.

19. NEOCLYTUS SOBRINUS. — *Niger; thorace postico cinereo; elytrorum lineis duabus obliquis et linea posticâ luteis.* — Long. 13 3/4 - 15 mill., lat. 4 5/6 - 5 mill. — Patrie : Le Brésil.

Clytus sobrinus Lap. et Gory, loc. cit., p. 29, pl. 6, fig. 35.— A. White, Cat. Br. Mus., p. 257, n. 39. = *Clytus crabroniformis* Dej., Cat., 3e éd., p. 357.

20. Neoclytus olivaceus. — *Niger; thoracis postico cinereo; elytris basi et postice cum fasciâ latâ luteâ cinereis, lunula suturali albâ.* — Long. 11-14 1/2 mill., lat. 3 1/2 - 5 mill. — Patrie : Le Brésil.

Clytus olivaceus Lap. et Gory, loc. cit., p. 30, pl. 7, fig. 36. — Dej., Cat., 3e éd., p. 356. — Ad. White, Cat. Br. Mus. p. 258, n. 41.

21. Neoclytus Burmeisteri. — *Affinis* Cl. olivaceo *sed angustior præsertim in prothorace, griseo-fuscoque coloratus, subtus antice pube lanata albida indutus; antennis pedibusque nigris; capite et prothorace fuscis, illo postice cinereo, longitudine carinato; scutello luteo; elytris nigro-fuscis, circa scutellum cinereis cum tertia parte apicali cinereo-luridoque terminatis, strigis duabus ante medium albidis ultima antice angulata, ad apicem oblique truncatis et extus subspinosis; pectore abdomineque albidis.* — Long. 11 mill., lat. 3 mill. — Patrie : Le Brésil.

Voisin du *Cl. olivaceus* Dej., Gory, mais en général plus étroit et allongé. *Tête* carrée, tronquée en devant, d'un noir cendré. *Palpes, mandibules, yeux* et *antennes* noirs. *Prothorax* cylindrique, noirâtre, gris sur le tiers basal, élevé longitudinalement au milieu et couvert d'aspérités transverses, le dessous ainsi que le dessus de la tête sont revêtus d'une épaisse pubescence laineuse blanche. *Écusson* semi-arrondi, blanchâtre. *Élytres* parallèles, tronquées obliquement à l'extrémité, avec l'angle externe aigu, d'un brun noirâtre jusque presque aux deux tiers, offrant ensuite une bande d'un blanc cendré, avec l'extrémité grise. *Poitrine* traversée au delà du milieu par une bande blanchâtre qui s'élargit sur les côtés. *Abdomen* d'un blanc soyeux. *Cuisses* assez longues et fortement renflées, les quatre genoux postérieurs sont uni-épineux en dedans.

Cette espèce provient des environs de Lagoa-Sancta (province de Saint Paul). Je l'ai reçue de M. M.-C. Sommer d'Altona.

Elle devra être placée après le *N. olivaceus* Lap. et Gory.

22. Neoclytus Batesii. — *Thorace nigro, antice griseo anguste late marginato, macula magna media postica nigra; elytris aureo-flavis, singulis macula marginali subhumerali; macula trapezoidea media, suturam non attingente, et apice nigris.* — Long. 10 1/2 mill. — Patrie : Amazone (Santarem).

Clytus Batesii Ad. White, Cat. British Museum, p. 257, n. 40.

23. Clytus Spixii. — *Niger; thoracis margine antico et postico maculâque transversâ utrinque luteis; elytris basi apiceque fuscis, lineâ arcuatâ*

et fasciis duabus transversis luteis; pedibus antennisque fuscis — Long. 15 mill., lat. 5 mill. — Patrie : Le Brésil.

Clytus Spixii Lap. et Gory, loc. cit., p. 92, pl. 17, fig. 107. — A. White, Cat. Br. Mus., p. 279, n. 130.

24. CLYTUS LATREILLEI. — *Niger, elytrorum fasciis quatuor, 2ª arcuata, luteis, antennis fuscis.* — Long. 11 mill., lat. 3 1/2 mill. — Patrie : Le Brésil, Rio-Janeiro.

Clytus Latreillei Lap. et Gory, loc. cit., p. 91, pl. 17, fig. 106. — Ad. White, Cat. Br. Mus., p. 279, n. 129.

25. CLYTUS? HILARII. — *Niger; elytris antice gibbosis, linea baseos arcuatâ, macula suturali, fasciâ media apiceque cinereis; antennis cinereo annulatis.* — Long. 14 1/2 mill., lat. 5 mill. — Patrie : Le Brésil, Rio-Grande.

26. MECOMETOPUS POLYGENUS. — *Niger, velutinus, brevis, cylindricus, parallelus; elytra antice maculis duabus flavis obliquis, dein ante medium macula trapezoidale commune suturale ornata, post medium usque ad apicem obscure grisea; metasternum utriusque parte large flavo-maculata; abdominis segmenta 1-2 et 3 in medio, flava; corpus minute granulosum.* — Long. 8 1/2 mill., lat. 2 1/2-3 mill. — Des bords de l'Amazone.

Mecometopus polygonus Thoms., Essai, 1860, p. 223, n. 134.

27. MECOMETOPUS PALMATUS. — *Velutinus, niger; thorace fusco; scutello elytrorum maculis tribus suturalibus luteis.* — Long. 11-15 mill., lat. 2 1/4-2 1/2 mill. — Brésil, Sainte-Catherine.

Callidium palmatum Ol., Ent., tom. 4, gʳᵉ 70, p. 29, n. 38, pl. 7, fig. 82. — *Clytus palmatus* Lap. et Gory, loc. cit., p. 84, pl. 16, fig. 97. — *Clytus festivus* Dej., Cat., 3ᵉ édit., p. 356. — *Clytus elegans* Dej., Olim.

28. MECOMETOPUS CENTURIO. — *Validiusculus, fuliginosus; palpis, mandibulis (apice nigris), labro, clypeoque ferrugineis; oculis, antennis et pedibus nigris; prothorace brevi, rotundato; scutello flavo; elytris fasciis tribus luteis; duabus mediis approximate et recte obliquis, ad suturam angulatis, 3ª transversa ante apicali, ad extremitatem pallide fulvis; in pectore fascia unica et in abdomine fasciis quinque, flavis.* — Long. 10 mill., larg. 3 mill. — Patrie : Le Brésil.

De couleur de suie. *Tête* carrée, tronquée, faiblement sillonnée, sur le milieu longitudinal. *Palpes*, *mandibules*, moins le sommet qui est noir, *lèvre* et *chaperon* ferrugineux. *Yeux*, *antennes* et *pattes* noires. *Prothorax* court, globuleux. *Écusson* semi-arrondi, jaune. *Élytres* ornées de trois bandes jaunes, les deux qui partent du milieu de la marge sont minces, rapprochées, obliques, parallèles, et forment angle sur la suture un peu en dessus, troisième avant l'extrémité, droite, sommet apical d'un fauve-clair jaunâtre, coupé presque carrément, avec l'angle externe à peine anguleux. *Poitrine* offrant une large bande jaune, arquée en arrière. *Abdomen* avec cinq bandes de même couleur. *Cuisses* assez courtes, genoux postérieurs non épineux, et brièvement subanguleux de chaque côté. *Tarses* brunâtres.

L'unique exemplaire ♀ que je possède m'a été envoyé par feu Guex, comme étant originaire du Brésil.

Cette espèce, très semblable à la précédente, s'en distingue par une taille plus forte, par son prothorax plus large et court, et enfin par la troisième bande des élytres qui, placée plus en arrière, est large et droite.

29. Mecometopus accensus. — *Simillimus præcedenti, sed prothorace in margine postico luteo, niger opacus cinereo indutus ; limbo postico prothoracis, scutello, fasciis tribus in elytris (duabus mediis approximatis, suturæ angulatis), in pectore fasciolis duabus et in abdomine fasciis quinque flavis.* — Long. 7 mill., lat. 1 3/4 mill. — Patrie : Le Brésil.

Apex elytrorum luridus.

Clytus pusillus Dej., Cat., 3e éd., p. 356.

D'un noir opaque. *Tête, prothorax* et le tiers apical des étuis, à partir de la troisième bande, de couleur cendrée. *Yeux* châtains. *Antennes* brunes, recouvertes d'une poussière cendrée, les six derniers articles sont renflés et noirâtres à certain jour. *Prothorax* globuleux, un peu allongé, offrant sur le milieu longitudinal une série d'aspérités espacées, son bord postérieur est étroitement marqué de jaune. *Écusson* semi-arrondi, jaune. *Élytres* parallèles, tronquées obliquement à l'extrémité, noires jusqu'aux deux tiers de la longueur, offrant deux bandes étroites, parallèles, obliques, jaunes, qui partent du milieu de la marge et se dirigent un peu plus haut sur la suture, troisième bande à peine plus large, droite, bien qu'un peu anguleuse sur le haut de la suture, l'espace qui existe entre la partie noire et cette bande est cendré, et la sixième partie apicale est d'un fauve clair jaunâtre, la troncature est droite, un peu anguleuse en marge. *Poitrine* avec deux petites bandes blanchâtres, et *abdomen* en pré-

sentant cinq qui sont d'un jaune verdâtre. *Pattes* d'un noir cendré. *Cuisses* modérément renflées, postérieures un peu plus longues. *Genoux* postérieurs uni-épineux. *Tarses* d'un cendré brunâtre.

Unique. L'étiquette de la collection Dejean l'indique comme ayant été trouvé au Brésil, par M. Th. Lacordaire.

Je possède un deuxième exemplaire que je crois devoir y rapporter, n'offrant qu'une légère frange jaunâtre sur la base du prothorax, avec les antennes noires sur leur moitié basale et cendrées au sommet, il provient du Newfribourg, et je le dois à M. le comte Mniszech.

30. MECOMETOPUS WALLACEI. — *Niger; ore, genis, antennisque fusco-ferrugineis, antennis apice pallidioribus, elytris linea brevi sub-basali et macula triangulari communi læte aureis, abdominis segmentis duobus primis niveis, meso et meta thoracibus subtus niveo maculatis; pedibus nigris, tarsis flavis.* — Long. 9 mill. — Brésil (Ega).

Clytus Wallacei White, Cat. Br. Mus., p. 259, n. 48.

31. MECOMETOPUS LÆTUS. — *Thorace rufo, elytris truncatis atris; maculis tribus flavis, antennis pedibusque ferrugineis.* — Long. 12 lat. 3 mill. — Patrie : Brésil (Para).

Clytus lætus F., Sys. El., II, p. 348. — Ad. White, Cat. Br. Mus., p. 259, n. 47.

32. TILLOMORPHA (1) CORTICINA. — *Coriacea, rufula, longe villosa; prothorace elongato, globoso, basi valde constricto, fasciculis duabus erectis; elytris infra medium basin unigibbosis, cum fascià luteolâ, ultra medium; femoribus clavatis; oculis supra emarginatis, infra rotundatis nigris.* — Long. 8 mill., lat. 3 mill. — Patrie : Le Brésil.

Clytus corticinus Dej., Cat., 3e éd., p. 357.

Coriacée, d'un roux clair, entièrement recouverte de longs poils de même couleur. *Tête* un peu plus longue que large, ne laissant voir à travers la villosité qu'un pointillé fin et allongé. *Yeux* latéraux, arrondis par le bas, noirs et n'offrant en dessus qu'un étroit prolongement arqué. *Antennes* velues, de onze articles, premier, troisième et cinquième grands, quatrième et sixième égaux, suivants un peu plus courts; elles atteignent aux quatre cinquièmes de la longueur des étuis. *Prothorax* allongé, globuleux, très comprimé sur la base, droit aux extrémités, couvert d'une ponctuation peu profonde, régulièrement réticulée, et d'une épaisse villo-

(1) Blanchard in Gay, Chili, V, p. 482.

sité; deux faisceaux de poils raides dirigés obliquement en avant, sont situés vers le milieu du disque. *Élytres* planes, du double plus larges que le prothorax à la base, coupées droit en avant, à angle obtus sur l'épaule, arrondies sur le sommet de la marge, elles offrent un tubercule ou bosse allongée, au dessous de la base sur le centre de chaque étui, et une bande d'un roux clair jaunâtre est située au delà du milieu. Les cuisses sont fortement renflées et les postérieures dépassent le corps presque de la moitié de leur longueur, elles sont très velues, ainsi que les jambes; les tarses sont jaunâtres.

De la collection Dejean, recueilli par M. Th. Lacordaire.

Nouveau genre: APELOCERA (1) Chevrolat.

Tête assez large, coupée droit dans sa moitié antérieure; front plus ou moins convexe ou déclive. *Palpes* maxillaires de trois articles; premier de la grandeur du dernier, gros, ovalaire, deuxième moité plus petit, dernier subcylindrique, tronqué. *Mandibules* petites. *Lèvre* étroite, en carré transverse, sillonnée en dessus, échancrée en devant. *Chaperon* large, cintré. *Yeux* distants, moyens, arrondis par le bas, plus ou moins échancrés en dessus. *Antennes* de onze articles; premier cylindriquement oblong, deuxième d'un quart au moins plus court, *troisième le plus long de tous, armé d'une longue épine à la terminaison*, quatrième à dixième égaux, moyennement longs, onzième plus court que les précédents, cylindrique, aigu. *Prothorax* allongé, globuleux, fortement resserré à la base. *Écusson* petit, incliné en devant, triangulaire. *Élytres* du double plus larges que le prothorax à la base, avancées et obtusément rectangulaires sur l'épaule, parallèles, arrondies ou faiblement tronquées à l'extrémité. *Poitrine* de moitié moins longue que l'abdomen; ce dernier ayant cinq segments. *Prosternum* terminé en arrière en pointe arrondie, obtuse. *Sternum* large au début, subitement subconique, tronqué au sommet, voûté en dessus. *Pattes* antérieures assez rapprochées, implantées au sommet de la hanche, un peu en arrière, arquées à leur naissance, les quatre suivantes sont plus espacées, cuisses renflées dans leur dernière moitié, jambes ou presque droites ou un peu arquées. Tarses à premier article grand, penultième

(2) Ἀπειλέω, *menacer*; κερας, *corne*. J'avais proposé de donner aux insectes devant rentrer dans ce genre (*The Journal of Entomologie*, London. 1861) le nom de *Eplophorus*; je l'abandonne, la racine n'ayant pas de signification propre.

bilobé, crochets simples. *Hanches* antérieures subarrondies. *Cavités cotyloïdes* circulaires. *Corps* ailé, coriacé en dessus.

Ce genre devra être placé près des *Tillomorpha*.

33. APELOCERA WALTLI. — *Affinis* CL. COMPRESSICOLLI Lap. et Gory; *nigra; antennis gracilibus; prothorace globoso valde convexo, medio longitudinaliter elevato, punctis subreticulatis; elytris basi singulatim unigibbosis, strigis anterioribus quatuor albidis, duabus posticis intra rubidis, summo apicali cinereo; primo segmento abdominis versus apicem alba fasciola signato, tertio articulo antennarum spinoso.* — Long. 7 1/2 mill., lat. 2 mill. — Patrie : Le Brésil.

Clytus elegans (Waltl).

Noire, finement ponctuée. *Tête* carrée, aussi longue en arrière que large en avant. *Palpes, bouche, antennes* (grêles), troisième article épineux, et *pattes* d'un brun clair couleur de poix. *Yeux* légèrement échancrés en dessus, brunâtres. *Prothorax* globuleux, ayant une voûture arquée en dessus, étranglé sur la base, muni de quelques longs poils pâles, à ponctuation arrondie, peu profonde et régulièrement réticulée. *Écusson* punctiforme. *Élytres* offrant au dessous de la base, sur chaque étui, une forte gibbosité, marquées de quatre faibles traits blanchâtres; premier au-dessous de l'épaule, appuyé à la marge et ne dépassant pas la hauteur du calus huméral, deuxième au dessous, oblique, n'atteignant ni la marge ni la suture, troisième allongé, anguleux sur le haut de la suture, quatrième transverse, situé un peu au delà du milieu, l'intervalle des deux derniers rougeâtre, quart apical cendré, extrémité tronquée. *Corps* en dessous noir. *Abdomen* offrant vers le bord postérieur du premier segment une bandelette blanche. *Cuisses* moyennement renflées.

Cette espèce, voisine du *Cl. compressicollis*, m'a été envoyée par M. Waltl, comme originaire du Brésil.

Elle se placera près du *Cl.* (*Tillomorpha*?) *spinicornis* Nob., qui formera une division dans le nouveau genre que j'établis.

SUPPLÉMENT

Espèces communiquées à l'auteur depuis le dépôt de son travail.

34. CYLLENE MINUTA. — *Valida, brevis; nigra; ore, antennis pedi-*

busque piceis vel flavis; in capite fasciâ posticâ oculos cingente, in prothorace fasciis tribus, in elytris fasciis quinque (1ª, 4ª, 5ª *obliquis*, 2ª *et* 3ª *ad medium postice undatis) lateribus pectoris, et in abdomine maculis sex* (*tribus ultimis transversis*) ; *lætè flavis* — Long. 6 1/2 - 8 1/2 mill., lat. 2-3 mill. — Brésil.

Courte, assez large, noire, plus ou moins recouverte de cendré. *Bouche*, *antennes* et *pattes* ferrugineuses, ces dernières quelquefois rembrunies. *Tête* profondément sillonnée, offrant en arrière une bande jaune, contournant chaque œil, bord antérieur et un court bandeau entre les antennes également jaunes. *Prothorax* plus arrondi que de coutume, non anguleux près de l'angle postérieur, marqué de trois bandes jaunes; première sur le bord antérieur, troisième sur le postérieur, deuxième au milieu. *Écusson* grand, semi-arrondi, noir, terminé de jaune. *Élytres* ornées de cinq bandes jaunes, première, quatrième et cinquième obliques, deuxième et troisième arquées en arrière sur le milieu de l'étui, carène médiane peu prononcée, terminée en une épine brève et anguleuse. *Poitrine* et *abdomen* portant chacun trois taches latérales, les trois dernières transverses.

Cette espèce, très petite pour le genre, est plus robuste qu'à l'ordinaire, ses antennes sont aussi assez épaisses, un deuxième exemplaire a les pattes brunâtres.

Trois exemplaires m'ont été communiqués par M. le comte de Mniszech.

35. Neoclytus ypsilon. — *Coriaceus*, *nigro-fuscus*, *pilis brevibus cinereis indutus*, *palpis*, *labro clypeoque testaceis*; *antennis tarsisque piceis*; *prothorace elongato ad medium longitudinaliter elevato et transverse asperato*; *scutello*, *in elytris fascia subscutellari extus abbreviata*, *macula suturali elongata cordiformi*, *notula infrà litteram Y efficiente*, *fasciola ad suturam angulata*, *notula transversa in metathorace*, *macula laterali oblonga in pectore luteis*; *abdomine cano*. — Long. 10 1/2 mill., lat. 3 mill. — Brésil.

Chagriné, d'un noir brunâtre, recouvert de petits poils courts cendrés. *Tête* presque aussi large que haute, tronquée en devant, sillonnée sur le front. *Palpes*, *lèvre* et *chaperon* testacés. *Antennes* et *tarses* d'un brun de poix. *Prothorax* allongé, étroitement élevé sur le milieu longitudinal, avec aspérités transverses, déprimé et relevé ensuite sur les côtés; sur cette partie sont quelques petits tubercules. *Écusson* semi-arrondi, d'un jaune-pâle. *Élytres* atténuées vers le sommet, obliquement tronquées et un peu échancrées sur l'extrémité, ornées d'une bande droite appuyée sur l'écusson, un peu recourbée en suture, et raccourcie en dehors, d'une

tache suturale allongée, cordiforme, d'un trait trifide ayant la forme d'un Y renversé et d'une bande oblique raccourcie en dehors, mais anguleuse sur la suture et qui est d'un jaune pâle, l'extrémité est bordée de cendré. *Métasternum* offrant un petit trait transverse. *Poitrine* ayant une tache latérale oblongue également jaune. *Abdomen* d'un blanc soyeux. *Cuisses* postérieures arquées à leur naissance, en massue allongée, dépassant le corps.

De la collection de M. le comte de Mniszech.

36. MECOMETOPUS PLACENS. — *Rufus; in elytris fasciis duabus (1ª basali tertiam partem anteriorem occupante, per lineam humeralem interrupta, 2ª ultra medium, fasciâ apicali griseâ) et in corpore infrà fasciis tribus læte flavis; lineola longitudinali infra prothoracem, limbo postico metathoracis, albis.* — Long. 8 mill., lat. 2 1/2 mill. — Brésil.

Modérément allongé, finement ponctué, d'un rouge vif. *Tête* longue, prolongée en dessous. *Mandibules* noires au sommet. *Yeux* d'un brun livide, lunulés au côté interne en dessus. *Antennes* un peu renflées vers le bout, dépassant du cinquième de leur étendue la base du prothorax. *Prothorax* allongé, globuleux, élevé sur le milieu et offrant une série d'aspérités transverses. *Écusson* jaune. *Élytres* deux fois aussi longues que le prothorax, parallèles, tronquées droit, avec l'angle externe muni d'une petite épine, offrant six bandes, dont trois sont rousses et deux jaunes, la première rousse est étroite, occupe la base et se recourbe sur la tranche humérale, pour se joindre à la deuxième médiane; la première bande jaune occupe le tiers antérieur et la deuxième jaune, de moitié moins large, est située au delà du milieu, le bout est terminé en gris. *Corps* en dessous, marqué sous le prothorax d'une ligne longitudinale étroite, et bordure inférieure du *métasternum* blancs. Une large bande traverse la poitrine, et les premier et deuxième segments de l'abdomen sont d'un beau jaune. *Cuisses* assez épaisses, chagrinées et rugueuses, postérieures dépassant du quart de leur étendue le sommet des étuis, genoux postérieurs brièvement bidentés.

Cette espèce devra se placer près du *M. lætus* F.

Unique. Collection de M. J. Thomson.

37. MECOMETOPUS MNISZECHII. — *Affinis certe* M. LÆTO Fab., *Elongatus, niger, minute punctulatus et coriaceus; capite prothoraceque (lineis tribus angustis et obscuris media integra scabrosa) rufis; palpis testaceis; mandibulis ad apicem nigricantibus; scutello, in singulo elytro maculis quatuor (1ª infra basin ovata postice angulata, 2ª punctiformi*

infra, 3ª *communi*, *magna subconica*, 4ª *transversali*, *conica*) *pectore abdomineque* (*ultimo segmento nigro*); *læte flavis*. — Long. 11 mill., lat. 3 3/4 mill. — Brésil.

Très voisin du *Clytus lætus* F. *Tête* rouge, prolongée en dessous, finement ponctuée. *Palpes*, *lèvre* et *mandibules* testacés. *Mandibules* noires sur l'extrémité. *Yeux* bruns. *Antennes* atteignant la base des pattes médianes, noires, les quatre premiers articles plus foncés, massue peu renflée, composée de sept articles allongés. *Prothorax* oblong, rouge, couvert d'un poil cendré plus dense sur les côtés, offrant trois lignes étroites un peu plus obscures, médiane élevée scabreuse, latérales arquées de la base jusqu'aux deux tiers. *Écusson* jaune. *Élytres* noires, couvertes d'une légère poussière jaunâtre, ornées chacune de quatre taches du plus beau jaune; première grosse, ovalaire, appuyée sur la base, anguleuse en dessous, deuxième petite, punctiforme, sous la pointe de la précédente, troisième commune, subconique, avec troncature en dessous, quatrième conique, placée en travers de l'étui, la pointe en dehors et la base sur la suture, sommet très obliquement tronqué, grisâtre, angle marginal très aigu. *Poitrine* et *abdomen* d'un beau jaune, pénultième segment en partie et dernier totalement noirs. *Pattes* noires, scabreuses, postérieures plus longues que les élytres, genoux postérieurs très brièvement biépineux.

De la collection de M. le comte de Mniszech.

38. Mecometopus insignis. — *Validus*, *niger velutinus*; *capite*, *prothorace* (*elongato notulis quatuor obsolete brunneis*), *antennisque in dimidia parte basali rubris*; *scutello*, *in elytris lineola obliqua basali maculis duabus communis latis triangularibus*, *et in corpore infra fasciis tribus læte flavis*. — Long. 10-16 mill., lat. 3 1/3 - 4 1/2 mill. — Brésil.

Épais, d'un noir velouté. *Tête* rouge finement et densément pointillée, chagrinée, sillonnée au milieu des antennes. *Palpes* testacés. *Mandibules* noires seulement au sommet. *Yeux* bruns, à peine échancrés. *Antennes* atteignant la base des pattes médianes, minces et ferrugineuses à la base, à massue noire, épaisse, composée de sept articles. *Prothorax* rouge, allongé, arrondi latéralement au milieu, offrant en dessus deux taches transverses, obscures, situées avant le milieu, et en dessous un gros point de même couleur. *Écusson* transverse, semi-arrondi, jaune, marqué d'un petit point noir en avant. *Élytres* larges, convexes, d'un beau noir velouté, très obliquement tronquées, avec chaque angle aigu, ornées vers le centre de la base d'une petite ligne oblique et de deux grandes taches communes, triangulaires, qui toutes trois sont du plus beau jaune; pre-

mière au dessous de l'écusson, deuxième au delà du milieu. *Poitrine* et *abdomen* noirs, une tache transverse sur le métasternum, une bande élargie coniquement sur chaque côté de la poitrine, une large bande sur le premier et le deuxième segment abdominal du même jaune qu'en dessus. ♀.

De la collection de M. le comte de Mniszech.

Nouveau genre : MYGALOBAS (1) Chevrolat.

Nouveau genre de *Clytide* propre au Brésil, voisin des *Tillomorpha* Blanch., et plus encore de celui de EPIPEDOCERA (*Clytoides* Blanch.) que je viens d'établir avec des espèces qui, toutes sont originaires des Indes-Orientales.

Caractères généraux :

Corps ailé, forme des *Tillomorpha*. *Antennes* comme chez les *Epipedocera*, parties extérieures longuement velues. *Élytres* planes, arrondies au sommet, uni-tuberculées au dessous de la base sur chaque étui. *Antennes* dépassant les deux tiers des élytres, aplaties, offrant un léger sillon longitudinal en dessus, un peu renflées et anguleuses au sommet des articles, le deuxième est un peu plus long que de coutume, le troisième le plus grand de tous a le double de longueur du quatrième, cinquième à huitième égaux et un peu plus longs que le quatrième, neuvième, dixième et onzième de même longueur, avec le dernier lancéolé. *Prothorax* globuleux, fortement aminci et resserré sur la base, couvert de points réticuleux, de longs poils et de deux faisceaux de poils. *Pattes* de moyenne longueur ; cuisses larges, fortement renflées, minces à leur naissance ; postérieures dépassant de moitié de leur longeur les étuis ; jambes postérieures planes, faiblement arquées, terminées par deux ergots droits et inégaux ; tarses à premier article un peu moins long que les suivants réunis ; crochets simples, petits et recourbés. *Sternum* aplati, avancé en angle sur le milieu postérieur. *Hanches* antérieures globuleuses. *Cavités cotyloïdes* circulaires.

39. MYGALOBAS FERRUGINEUS. — *Rufus, longe pilosus, coriaceus; antennis planis, longitudine uni-sulcatis articulis* 5-10 *subangulatis; prothorace globoso, ad basin fortiter constricto, fasciculis duabus dorsalibus erectis; elytris planis, ad apicem rotundatis, singulis, infra basin tuberculum rotundatum efficientibus, fasciâ mediâ brunnea antice ad suturam*

(1) Mygale, genre d'Arachnide; βαίνω, je marche.

angulata; pedibus crassis, femoribus medio inflatis, supra planis, tibiis arcuatis. — Long. 10 1/2 mill., lat. 3 mill. — Brésil.

Ferrugineux, longuement poilu, chagriné. *Tête* arrondie, un peu plus longue que large. *Yeux* bruns. *Antennes* moins longues que le corps, de onze articles, plans, unisillonnés en dessus, cinquième à dixième faiblement anguleux au sommet. *Prothorax* globuleux en avant, fortement resserré sur la base, offrant sur la région dorsale antérieure deux faisceaux de poils raides. *Écusson* petit, punctiforme. *Elytres* planes, arrondies au sommet, présentant au milieu de l'étui, au dessous de la base, un petit tubercule rond et une bande médiane rousse, anguleuse sur la suture, le quart apical est aussi roux; on remarque au dessous du tubercule un sillon oblique qui est dirigé au-dessous de l'épaule vers le bas de la suture. *Corps* en dessous brillant, le bord inférieur de la poitrine sur le côté est marqué d'une tache transverse jaunâtre. *Pattes* robustes, poilues, cuisses fortement renflées, planes en dessus, jambes arquées, également planes, tarses à premier article égal aux deux suivants, celui des pattes postérieures est un peu plus long.

Cette espèce, d'après la structure de ses antennes et la forme robuste des pattes, méritait bien de constituer un genre.

Unique; de la collection de M. le comte de Mniszech.